

BOTOX

FICHE D'INFORMATION ET DE CONSENTEMENT

Traitement à la toxine botulinique.

Produit recommandé et utilisé par le Médecin :

La toxine Botulinique est une protéine issue de culture bactérienne « Clostridium Botulinum ». Elle est utilisée depuis 1989 après les travaux d'Alan Scott dans la correction de strabisme et du blépharospasme de l'adulte, puis ultérieurement dans plusieurs pathologies musculaires comme le torticolis spasmodique, les spasmes de la face, les dysphonies etc.... Son efficacité dans le traitement des rides a été établie depuis 1992 par les Docteurs Jean et Alastair Carruthers, Ophtalmologue et Dermatologue canadiens. Le traitement consiste à injecter de très faibles doses de la substance active de toxine Botulinique purifiée et atténuée directement dans les muscles responsables des rides afin de diminuer leur hyperactivité.

PRECAUTIONS A PRENDRE AVANT LES INJECTIONS

La prise d'aspirine, d'anti-inflammatoire ou d'antiagrégants plaquettaire est à éviter 8 jours avant les injections.
Le jour des injections, vous n'avez pas besoin d'être à jeun.
Tout maquillage devra être retiré.

DEROULEMENT DES INJECTIONS

- La peau est désinfectée.
- On injectera ensuite à l'aide d'une seringue et d'une aiguille, des petites doses de solution de toxine botulinique dans les muscles de la glabelle, sur des points très précis.
- Il n'est pas nécessaire de pratiquer une anesthésie locale au préalable, les injections étant très peu douloureuses.

PRECAUTION A PRENDRE APRES LES INJECTIONS

- La prise d'aspirine est déconseillée pendant 8 jours après les injections.
- Il faut éviter de s'allonger dans les quatre heures qui suivent l'intervention, de mettre la tête en bas ou complètement en arrière, de masser les zones d'injection et de prendre un avion immédiatement après le traitement.
- Pas de sauna.

EFFETS OBTENUS

L'efficacité apparaît dès la première semaine, atteint son maximum en un mois et se maintient pendant 4 mois environ. Le retour à l'état initial est progressif et à partir du 4^{ème} ou 6^{ème} mois les contractions musculaires reprennent lentement et les rides réapparaissent progressivement telles qu'elles étaient avant l'injection. Une nouvelle séance d'injection de toxine Botulinique peut être alors proposée.

Le résultat des injections de la toxine Botulinique à visée esthétique peut être variable d'un patient à l'autre. Il dépend des caractéristiques anatomiques des muscles, en particulier de leur puissance, de l'épaisseur de la peau et de la profondeur des rides. Plus les muscles sont puissants et la peau est épaisse et moins le résultat sera complet.

Les injections de toxine Botulinique à visée esthétique ont pour objectif de vous satisfaire dans des proportions réalistes. Seule une évaluation précise, avec votre médecin, des modifications de votre aspect esthétique que la toxine Botulinique peut induire, vous permettra d'obtenir le meilleur résultat.

CALENDRIER DES INJECTIONS

Il varie en fonction des patients. En général une 2^{ème} séance est à prévoir en respectant un délai de 3 mois minimum et une troisième séance se fera après 9 à 12 mois, soit en moyenne de trois séances par an pour maintenir un résultat. Les réinjections de feront à partir du moment où la ride réapparaît et que vous en faites la demande.

La formation d'anticorps est possible, mais elle reste exceptionnelle dans l'utilisation esthétique de la toxine.

Cependant pour éviter cet effet « vaccin », il est nécessaire de respecter un délai minimum de 3 mois entre chaque séance, sauf retouche éventuelle.

CONTRE-INDICATIONS

Les contre-indications sont peu fréquentes, mais importantes à respecter.

- Les contre-indications absolues sont la myasthénie, certaines maladies neuro-musculaires, un traitement concomitant avec des aminosides, une allergie à la toxine Botulinique et une attente de résultats irréalistes.
- Des contre-indications locales relatives existent : cicatrices, dermatose inflammatoire en poussée entre les sourcils. Il faudra les traiter au préalable.
- Un traitement anticoagulant ou antiagrégant (aspirine par exemple) à dose efficace en cours, nécessite des précautions d'emploi. Vous devez par conséquent, en cas de moindre doute, effectuer les examens nécessaires et en communiquer les résultats à votre dermatologue.
- Toute grossesse, même débutante (quelques jours seulement) nécessite de repousser la date des injections après la grossesse et l'allaitement. Vous devez par conséquent, en cas de moindre doute, effectuer les examens nécessaires et en communiquer les résultats à votre dermatologue.

Prévenez votre médecin, si vous êtes soigné(e) par ailleurs par des injections de toxine Botulinique pour des spasmes pathologiques ou pour une hypersudation.

D'une manière générale, vous ne devez pas hésiter à mentionner le moindre problème de santé.

EFFETS SECONDAIRES ET COMPLICATIONS

Les effets secondaires et les complications sont rares et transitoires, ils seront d'autant plus facilement évités que les contre-indications et les précautions d'usages seront respectées.

- Ecchymoses, œdème, douleurs aux points d'injections.
- Mal de tête passager.
- Ptosis de la paupière supérieure, se manifestant par une ouverture limitée de la paupière. Cet effet est rare (0,5% à 5% des cas) et est toujours réversible, sa durée est plus courte que l'effet de la toxine Botulinique sur les rides et peut durer jusqu'à 4 semaines environ. Un traitement local pourra être prescrit par votre médecin le cas échéant.
- Abaissement des sourcils, résultats asymétriques, une correction sera alors possible par de minimes injections
- Diplopie transitoire (vue double)
- Résistance au traitement
- Allergie à la toxine Botulinique

S'agissant d'un acte à visée esthétique, aucune prise en charge par l'Assurance Maladie ne peut avoir lieu, y compris pour un arrêt de travail (sauf cas exceptionnel aucun arrêt d'activité n'est nécessaire).

Il est convenu que des photos avant/après l'intervention seront effectuées dans un but de suivi du traitement et de tenue du dossier médical et éventuellement dans un but exclusivement scientifiquement et/ou éducatif.

Votre consentement éclairé aux injections est indispensable. Il doit faire suite à une information détaillée et claire pour arrêter votre choix sur les bénéfices attendus et les suites prévisibles des injections ainsi que sur les autres alternatives thérapeutiques possibles.

Devis

Prix TTC : **420 Euros**

Je reconnais avoir lu et compris les informations ci-dessus et je consens librement et volontairement à me faire injecter.

Date : le

**Nom et Prénom, signature du patient
précédés de la mention "lu et approuvé"**